


График вакцинации ДО 2 лет



1 – Вакцинация от туберкулеза в районах с высокой заболеваемостью проводится вакциной БЦЖ, с низкой БЦЖ-М.

2 – Для групп риска по гепатиту В

1) Родившиеся от матерей:

- носителей HBsAg;
- инфицированных вирусом гепатита В;
- перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности;
- не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В;
- потребляющих наркотические средства или психотропные вещества;

2) Из семей, в которых есть:

- носитель HBsAg;
- больной острым вирусным гепатитом В;
- больной хроническими вирусными гепатитами.

3 – Проводится живой оральной вакциной - капли в рот

4 – Существует две схемы вакцинации:

- 3+1 предпочтительна для всех детей. Показана недоношенным, детям живущим с ВИЧ, детям с первичным и вторичным иммунодефицитами
- 2+1 допустима для всех детей

5 – Схема вакцинации от менингококковой инфекции при начале:

- с 6 нед. до 6 мес.: 3 дозы с интервалом не менее 2 мес. Ревакцинация однократно после 12 мес.
- с 6 до 12 мес.: 1 доза на первом году жизни. Ревакцинация однократно после 12 мес.
- с 12 мес.: 1 доза

6 – Детей, родившихся от серонегативных к вирусу кори матерей (не болели, не привиты), вакцинируют в возрасте 8 месяцев. Такая доза считается нулевой и проводится монокомпонентной коревой вакциной. Далее проводится вакцинация в 14-15 месяцев и 6 лет

7 – По эпидемиологическим показаниям можно вакцинироваться в любое время от 1 года до 6 лет, но не ранее, чем через 3 месяца после первой дозы.

8 – При неблагоприятной эпидобстановке, детям, родившимся от серонегативных (не болели, не привиты) матерей, начало вакцинации возможно с 9 мес.

9 – Вакцинация от клещевого энцефалита проводится в эндемичных районах или выезжающим в эндемичные районы. Каждый год в январе Роспотребнадзор обновляет этот список.

Схема вакцинации от клещевого энцефалита: 2 дозы с интервалом 1 месяц. Ревакцинация через 9-12 месяцев от второй дозы. Далее ревакцинация проводится каждые 3 года.

По эпидемическим показаниям может проводиться ускоренная вакцинация. В этом случае вакцину вводят двукратно с интервалом 2 недели, и далее продолжают по схеме.