


График вакцинации ПОСЛЕ 2 лет



1 – Для детей с отрицательной пробой Манту в год ревакцинации, и не ранее чем через 5 лет после введения V1.

2 – Вакцинация от гепатита В проводится ранее не привитым по схеме 0-1-6.

3 – При вакцинации до наступления 6 лет допустимо применение вакцины Пентаксим. После наступления 6 лет вакцина Адасель.

4 – После достижения 7 лет RV3 (6 доза) не требуется.

5 – Для тех, кто не успел привиться до 5 лет.

6 – С 6 лет вакцинация проводится, только если есть медицинские показания.

7 – До 5 лет вакцинация от пневмококковой инфекции проводится однократно ранее не привитым. От 5 лет группам риска и по желанию.

8 – Дополнительная ревакцинация с применением вакцины Пневмовакс 23 требуется только лицам с повышенным риском пневмококковой инфекцией.

9 – После 1 года вакцинация однократно при применении вакцины Менквадфи, однократно после 2 лет для вакцин Менактра и Менвэйд

10 – Подростки, привитые в раннем детстве, должны получить 1 дозу в 9-11 лет и в дальнейшем через 5-7 лет.

11 – Неболевшим и двукратно непривитым, вакцинация проводится 2 дозами. Минимальный интервал между дозами 4 нед. такой интервал используется для подростков и взрослых.

Оптимальный интервал – 3-6 мес. При отсутствии повышенного риска заражения у детей ориентируемся на оптимальный интервал.

12 Схема вакцинации может меняться в зависимости от вакцины и от предыдущей вакцинации от гриппа.

13 – Схема вакцинации от ВПЧ при начале вакцинации:

а) от 9 до 13 (14*) лет: 0-6 вторая доза вводится через 6 месяцев после первой.

б) с 14 (15*) лет: 0-2-6-вторая доза через 2 месяца после первой,

третья – через 6 месяцев после первой.

*для вакцины «Церварикс»

14 – Вакцинация от клещевого энцефалита проводится в эндемичных районах или выезжающих в эндемичные районы. Каждый год в январе Роспотребнадзор обновляет этот список.

Схема вакцинации от клещевого энцефалита: 0-1-13

(вторая доза через месяц после первой, третья через год после второй).

Далее одна доза один раз в три года.

По эпидемическим показаниям может проводиться ускоренная вакцинация. В этом случае вакцину вводят двукратно с интервалом 2 недели, и далее продолжают по схеме третья доза через год от второй и далее 1 раз в 3 года.

